

# HYPOSPADIAS

## *¿Que es hypospadias?*

Hypospadias es una anomalía congénita del pene que está caracterizada por una posición anormal de la abertura uretral. Hypospadias aparece en muchas formas. La abertura uretral puede estar en cualquier parte, desde la punta del pene hasta el escroto y en ocasiones, tan lejos como el ano. La mayoría de los casos ocurren con la abertura cercana a la cabeza del pene.

## **Hypospadias esta asociada con:**

- El aspecto anormal de la glans pene (cabeza del pene)
- La formación anormal del antepiel
- Endoblamiento hacia abajo del pene

## *¿Que tan común son las hypospadias?*

El índice de hypospadias parece estar en un aumento. En los Estados Unidos, se reporta que hay uno dentro de 250 a 500 nacimientos de varones. Hay una tendencia familiar con el aumento del índice cuando el papá o los hermanos tienen un historial de hypospadias.

## *¿Que causa las hypospadias?*

En la mayoría de casos, la causa de hipospadias es desconocida. Ocasionalmente es a causa de una acción hormonal anormal. Aun más rara es una anomalía de las cromosomas sexuales.

## *¿Se necesita arreglar las hypospadias ?*

Las hipospadias menores, generalmente son un problema cosmético. Niños con hipospadias moderadas o severas, pueden tener problemas funcionales. Los niños pueden tener dificultad al orinar y no pueden orinar parados. Los niños con hipospadias moderadas o severas también pueden tener un impedimento con la fertilidad. Si su niño también tiene una curvatura del pene, esto puede afectar su función sexual cuando él sea mayor. Las hipospadias no pasan en cuanto los niños crecen y no hay medicamentos para tratar o arreglar el problema. Las hipospadias han sido arregladas por medio de cirugías por muchos años con gran éxito. Como en la mayoría de cirugías, especialmente para niños pequeños, las hipospadias deben ser reparadas por un especialista quien haga muchas reparaciones.

## *¿Cómo se reparan las hypospadias?*

Para poder traer el abrimiento uretral a la cabeza del pene, un nuevo tubo uretral es creado. Este tubo es hecho de piel local y/o de antepiel. Si se sospecha que su hijo tiene un endoblamiento del pene, una erección artificial será inducida durante la cirugía para determinar si se necesita una corrección. Muchas suturas (puntadas) absorbentes serán usadas. Estas se desolverán y no tendrán que ser removidas.

Después de hacer el nuevo tubo uretral, frecuentemente el cirujano deja un tubito (catéter) en el pene. Este sirve como un molde mientras el nuevo tubo sana. Este tubito sirve para drenar la vejiga para que su hijo no necesite orinar. Este tubito drenal, usualmente es removido dentro de cinco a diez días después de la cirugía en la oficina médica.

## *¿Que más necesito saber sobre la cirugía?*